

“FIBROLIPOMA DELLA LARINGE: A CASE REPORT”

Monica Capellino - A.Barbieri, M.Barbieri

Il fibrolipoma della laringe è una neoplasia benigna rara, rappresenta lo 0,5 % delle neoplasie benigne che colpiscono questo organo. I lipomi si sviluppano solitamente a livello delle false corde, meno frequentemente a livello della plica ariepiglottica e dell'epiglottide, estremamente raro a livello sottoglottico. I sintomi sono in rapporto alle dimensioni e alla localizzazione della neoformazione, lipomi di piccole dimensioni rimangono silenti per lungo tempo e vengono diagnosticati solitamente durante una laringoscopia di routine, al contrario neoformazioni di maggiori dimensioni provocano: disfagia, tosse parossistica, sensazione di corpo estraneo in faringe, dispnea inspiratoria, in rari casi la neoformazione può essere aspirato nelle vie respiratorie occludendole completamente e portare alla morte in pochi minuti. Alla TC appare come una massa omogenea con scarsi sepimenti fibrosi, basso numero di attenuazione. La RMN permette di valutare con maggiore accuratezza l'estensione della neoformazione in rapporto alle strutture anatomiche ed una migliore definizione della tipizzazione della neoformazione, grazie all' utilizzo di diverse sequenze: alto segnale di intensità nelle sequenze T1-pesate, intermedio nelle sequenze T2-pesate, e basso nelle sequenze Fat Suppression. Il trattamento prevede l'exeresi chirurgica, tendenzialmente in microlaringoscopia salvo casi particolari, e non è necessario alcun tipo di terapia di supporto, sebbene siano indispensabile un follow-up attento vista la tendenza a recidivare.