

## **"VALUTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MULTICONFORMITA' DEI CARCINOMI TIROIDEI: NOSTRA ESPERIENZA"**

**Giulio Biccio** - L.Firrisi, F.Lamanna, M.Radici

Obiettivo dello studio: valutare la percentuale della multifocalità dei carcinomi tiroidei giunti all'osservazione dell'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale della nostra struttura, valutando istologicamente i pezzi operatori ottenuti dopo chirurgia tiroidea.

Materiali e metodi: si è effettuato uno studio retrospettivo su tutti i pazienti operati per patologia tiroidea (gozzo uni-multinodulare, carcinomi, tumori a comportamenti incerto, cisti, ecc) durante gli anni 2003 - 2006.

Risultati: su un numero totale di 101 pazienti operati per patologia tiroidea, sono state effettuate 69 (68,3 %) tiroidectomie totali e 32 (31,7%) tiroidectomie parziali. Di tutti i pazienti operati 23 (22,7%) presentavano carcinomi, tutti di tipo papillifero. Su 32 emitiroidectomie 3 (9,3%) presentavano lesioni neoplastiche, tutte unifocali. Tali pazienti sono stati successivamente sottoposti a totalizzazione. Su 69 tiroidectomie totali, 20 (29%) presentavano carcinomi papilliferi con una multifocalità in 7 (35%) casi. Il numero di carcinomi multifocali scoperti postoperatoriamente mediante esame istologico sul pezzo operatorio considerando totalmente la patologia tiroidea da noi trattata, è di 7 casi (6,9%); soffermandosi sul numero totale dei carcinomi la percentuale sale al 30,4%.

Conclusioni: la percentuale di multifocalità dei carcinomi tiroidei da noi trattati, si attesta sui valori della letteratura medica recente. Tale valore giustifica appieno un intervento di tiroidectomia totale in tutti i pazienti con diagnosi preoperatoria mediante FNAB di carcinoma tiroideo, ed ancor di più una totalizzazione in quei pazienti trattati con chirurgia più conservativa con diagnosi istologica preoperatoria di lesione benigna posta nel contesto ghiandolare.