

"UN CASO DI PEMFIGOIDE MUCOSINECHIANTE CON COINVOLGIMENTO NASALE E LARINGEO"

Chiara Bellini - M.Trimarchi, S.Gerevini, M.Bussi

Il pemfigoide mucosinechiante è un disordine autoimmune cronico caratterizzato da manifestazioni mucose spesso multiple. Questa rara condizione colpisce prevalentemente alcuni organi, quali ad esempio il cavo orale, gli occhi, la cute, i genitali, la mucosa nasale, faringea, esofagea e laringea. Presentiamo il caso di un paziente con coinvolgimento multiorgano.

Un uomo di 53 anni è giunto alla nostra attenzione, presso il Dipartimento di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale San Raffaele di Milano, con diagnosi antecedente di pemfigoide mucosinechiante e una storia clinica di circa 4 anni, caratterizzata da un intervento di odontocheratoprotesi all'occhio destro. Il paziente presentava sintomi oculari e urinari associati a ostruzione respiratoria nasale e disfonia. All'indagine endoscopica nasale era evidente un quadro di rinite crostosa e sinechie diffuse su una mucosa nasale pallida e atrofica. L'imaging radiologico confermava la presenza di materiale infiammatorio occupante i seni paranasali e le fosse nasali. In fibrolaringoscopia erano presenti una sinechia laringea localizzata in sede paracommissurale e una in sede aritenoidea.

Il paziente è stato sottoposto a chirurgia endoscopica naso-sinusale allo scopo di rimuovere il materiale cicatriziale e infiammatorio dai seni paranasali e lisare le sinechie con posizionamento di splints parasettali.

Per quanto riguarda il coinvolgimento laringeo si è deciso di effettuare un follow up stretto sulla lesione senza intervenire chirurgicamente.

Gli splints parasettali sono stati lasciati in sede per circa un anno. Al controllo le vie aeree risultavano pervie, senza segni di ostruzione nasale.

L'approccio endoscopico nel trattamento chirurgico delle forme di pemfigoide mucosinechiante con coinvolgimento nasale sembra essere efficace soprattutto se associato all'utilizzo di splints nasali a lunga permanenza.