

“TRATTAMENTO CHIRURGICO ENDOSCOPICO CON LASER CO2 DI LARINGOCELE INTERNO”

Raffaele Sorrentino - E.Cappellaro, A. Medici, A.Fasciolo

Il laringocele è una malformazione della laringe consistente in una sacca aerea che interessa inizialmente il ventricolo di Morgagni (laringocele interno) e, successivamente, insinuandosi attraverso il muscolo costrittore inferiore della faringe, può protrudere verso l'esterno manifestandosi come tumefazione latero- cervicale (laringocele esterno).

Alla TC appare come massa liscia, ovoidale e radiotrasparente; può infettarsi (laringopiocele) o riempirsi di liquido mucoide.

Può essere congenito o acquisito. I sintomi più caratteristici sono la disfonia, la disfagia e la dispnea.

La terapia è chirurgica.

In questo video presentiamo un caso di laringocele interno in una giovane paziente giunta alla nostra osservazione d'urgenza per dispnea acuta laringea.

Mediante la videoendoscopia abbiamo rilevato una grossa neoformazione sacculare che occupava quasi completamente lo spazio respiratorio laringeo.

A quel punto si è deciso, in accordo con la paziente, per una narcosi immediata con intubazione mediante broncoscopio e la successiva disostruzione chirurgica della laringe mediante laser CO2.

L'intervento ha condotto alla asportazione completa in monoblocco della neoformazione, alla risoluzione della dispnea senza il ricorso alla tracheostomia e alla dimissione della paziente nelle 24 ore successive dopo controllo TC.