

"VOLUMINOSO MUCOCELE DEL SENO MASCELLARE: APPROCCIO PER VIA ENDOSCOPICA"

Giovanni Tomacelli - M.Arigliani, F.Antico, A.Taurino

Un giovane paziente si presentava alla nostra attenzione con asimmetria facciale senza sintomatologia alcuna. Sottoposto ad esame endoscopico e TC senza mdc veniva posta diagnosi di voluminoso mucocele del seno mascellare realizzante usura della parete anteriore, entrando dunque sia in diretto contatto con i tessuti molli facciali che provocando una modificazione morfologica dell'apertura piriforme. Molteplici sono le ipotesi etiopatogenetiche sullo sviluppo del mucocele, maggior enfasi in letteratura è posta sulle flogosi ricorrenti, post-traumatica e post-chirurgica (Caldwell-luc, Le fort I, Cicatriziale etc.). Il mucocele del seno mascellare che usura la componente ossea è in letteratura poco frequente costituendo solo 1% di tutti i mucoceli dei seni paranasali. Il trattamento da noi effettuato, in accordo con la maggior parte della letteratura, è stato di realizzare attraverso l'approccio endoscopico l'uncinectomia con marsupializzazione del mucocele e calibrazione dell'ostio naturale senza la rimozione della parete dello stesso con altro e più invasivo approccio e non ricostruendo la parete ossea usurata. Il decorso post-operatorio è stato regolare realizzando il recupero della normale morfologia facciale dopo circa 3 settimane.