

"EXERESI CERVICOTOMICA DI CISTI LATERALE DEL COLLO"

Pasquale Zingariello - A.Moretti, L.D'agostino, F.Vitullo, A.Croce

Le cisti e fistole laterali del collo rappresentano delle particolari affezioni congenite che insorgono secondariamente al mancato riassorbimento di alcune strutture di origine branchiale. Queste forme laterali differiscono nettamente da quelle mediane (da alterato riassorbimento del dotto tireoglossa) non solo per la sede ma anche per le caratteristiche cliniche e l'embriogenesi diversa.

A seconda della loro localizzazione si distinguono in malformazioni sovra-ioidee (cisti e fistole che originano dal primo solco branchiale) e malformazioni sotto-ioidee (originano dal secondo, terzo e quarto solco branchiale).

La maggior parte delle cisti laterali del collo originano da anomalie di discesa del secondo arco branchiale nella formazione del seno cervicale. Secondo la classificazione di Baley distinguiamo cisti latero-cervicali localizzate appena sotto l'aponeurosi cervicale superficiale davanti allo sterno-cleido-mastoideo (tipo I), cisti localizzate sotto l'aponeurosi cervicale media davanti e al di fuori dei grossi vasi del collo (tipo II), cisti che insorgono tra carotide interna ed esterna (tipo III) oppure tra parete faringea ed asse vascolare (tipo IV). Le cisti laterali si manifestano di solito nei soggetti giovani o di età media (15-40 aa), sottoforma di una tumefazione ovoidale, liscia, piuttosto dura con sede abituale all'altezza dell'osso ioide, sotto il bordo anteriore del m. sternocleidomastoideo.

Gli Autori propongono un video di asportazione di una cisti laterale del collo di tipo II per via cervicotomica laterale, in una paziente di 17 anni che lamentava l'insorgenza da circa tre mesi di una tumefazione latero-cervicale sinistra di consistenza teso-elastica e localizzata all'altezza del terzo inferiore del m. sternocleidomastoideo.

L'esame RM del collo evidenziava la presenza di una neoformazione latero-cervicale di circa 4x7 cm di dimensione, dai contorni regolari, a struttura omogenea che rispettava le strutture vascolo-nervose del collo localizzandosi al di sotto dello sternocleidomastoideo.