

“Iniezioni trans-timpaniche di gentamicina come terapia della Malattia di Menière”

Pier Paolo Cavazzuti - R.Consalici, D.Dall'Olio, G.Latini, N.Zarro

L'uso di iniezioni trans timpaniche di gentamicina sta imponendosi in campo internazionale come prima scelta terapeutica in pazienti con malattia di Menière resistente alle terapie conservative, rendendo sempre più raro il ricorso ad interventi di neurotomia del vestibolare.

Anche presso la nostra Unità Operativa, dove la neurotomia viene praticata da due decenni senza complicanze, la gentamicina costituisce attualmente la prima scelta per l'ablazione labirintica.

La metodica della labirintectomia, o, meglio, della sublabirintectomia chimica con gentamicina è caratterizzata infatti da bassa invasività, da assenza di effetti collaterali extra-auricolari e soprattutto da elevata efficacia.

Inoltre, visti i risultati incoraggianti sulla funzione uditiva residua al termine del trattamento, l'indicazione alla gentamicina può essere estesa anche a pazienti che non abbiano ancora importanti danni uditivi.

Il video illustra le modalità di somministrazione della gentamicina presso il nostro centro e la nostra casistica di pazienti trattati, con particolare riguardo ai risultati ottenuti sul controllo della vertigine e i danni subiti dalla funzione uditiva.